

	<b>STIKES NOTOKUSUMO YOGYAKARTA</b> <b>DIPLOMA III KEPERAWATAN</b>					
	<b>UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A 2023/2024</b>					
Mata Kuliah : Keperawatan Maternitas Dosen : 1. Barkah Wulandari, S.Kep., Ns., M.Kep 2. Ns. Wiwi Kustio P., A.Kep.,SPd.,MPH 3. Prima Daniyati K., S.Kep., Ns., M.Kep 4. Eny Septi Wulandari DP, M.Kep	Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024 Waktu : 09.00-10.40 WIB	 <b>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  NOTOKUSUMO YOGYAKARTA</b> <b>SOAL UJIAN SUDAH DIVALIDASI</b>				
		<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">TANGGAL</td> <td style="text-align: center;">PARAF</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">99</td> </tr> </table>	TANGGAL	PARAF		99
TANGGAL	PARAF					
	99					

**PETUNJUK :**

Pilihlah Salah Satu Jawaban yang Saudara Anggap Benar dengan Memberi Tanda Silang (X) pada Item Jawaban A, B, C, D dan E di lembar Jawaban

**Selamat Mengerjakan**

**SOAL :**

1. Seorang perempuan, memerah ASI dan kemudian mendiampkannya didalam suhu ruangan. Ibu memberikan bagian hindmilk kepada anak sesuai saran dokter ketika konsultasi. Apakah fungsi bagian yang diberikan ibu dalam kandungan ASI?
  - a. Fungsi penglihatan
  - b. Mengurangi rasa haus
  - c. Memperkuat tulang bayi
  - d. Memberikan energi pada bayi
  - e. Membantu mempercepat pembentukan saraf
2. Seorang perawat mengajarkan teknik menyusui yang benar kepada pasien sebagai perencanaan discharge planning. Apa yang perlu diperhatikan dalam edukasi kepada pasien sesuai dengan perencanaan perawat?
  - f. Mulut tidak terbuka lebar
  - g. Putting susu masuk ke mulut bayi
  - h. Dagu tidak menempel pada payudara
  - i. Semua bagian aerola masuk ke mulut bayi
  - j. Dada bayi tidak menempel dengan dada ibu
3. Seorang ingin mengetahui beberapa hal terkait indikator menyusui yang efektif untuk bayi. Apa poin penting yang dapat disampaikan perawat terkait hal tersebut?
  - a. Turgor kulit
  - b. Feses dan urin
  - c. Putting susu lecet
  - d. Menyusu sebentar
  - e. Berat badan tidak meningkat
4. Berapakah indicator kenaikan berat badan bayi (usia dibawah 6 bulan) untuk melihat kecukupan nutrisi bayi?
  - a. 200 gr/ mg
  - b. 100 gr/ mg
  - c. 300 gr/ bulan
  - d. ≤ 500 gr/ bulan
  - e. 1000 gr/ bulan
5. Berikut ini merupakan tanda peringatan dari proses menyusui efektif?
  - a. Tinja berwarna kuning
  - b. Lama Menyusu ± 10 menit
  - c. Aeora masuk semua ke mulut bayi
  - d. BAB kurang dari 5 kali dalam sehari
  - e. Bayi kurang dari 6 popok basah per hari

6. Seorang perempuan, umur 20 tahun, P1A0, post partum spontan hari 1. Berdasarkan pengkajian fisik didapatkan hasil bahwa payudara lembek, puting susu sudah menonjol, sudah keluar ASI. Ibu setiap menyusui selalu kesakitan dan mengalami luka pada puting susu. Apa masalah keperawatan yang tepat untuk kasus diatas?
  - a. Ketidakcukupan ASI
  - b. Diskontinuitas pemberian ASI
  - c. Ketidakefektifan pemberian ASI
  - d. Ketidakefektifan pola makan bayi
  - e. Kesiapan meningkatkan pemberian ASI
7. Berapa lama ASI tahan di lemari pendingin?
  - a. 12 Jam
  - b. 1 Hari
  - c. 2 Hari
  - d. 3 Hari
  - e. 4 Hari
8. Seorang perempuan, umur 26 tahun, P1A0, ingin mengetahui mengenai tanda apakah ASInya cukup bagi bayi. Pasien direncanakan pulang pada siang hari. Berikut ini informasi yang dapat disampaikan oleh perawat terkait kebutuhan pasien tersebut adalah:
  - a. Peningkatan berat badan 1 minggu 200 gram
  - b. Jumlah BAK kurang dari 6 kali dalam sehari
  - c. Jumlah BAB bayi usia 1 bulan 2 kali/ sehari
  - d. Bayi mudah terbangun ketika tidur
  - e. Lama menyusui bayi 5 menit
9. Seorang perempuan, umur 26 tahun, P1A0, post partum hari 1 dirawat di ruang nifas RS. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan data bahwa puting susu menonjol, aerola bersih, kedua payudara teraba hangat dan mengalami breast engorgement dan badan ibu demam dengan suhu 37,8 C. Bayi belum dilakukan rawat gabung. Ibu memiliki keinginan kuat untuk memberikan ASI Eksklusif. Apa Masalah keperawatan yang sesuai untuk kasus diatas?
  - a. Ketidakcukupan ASI
  - b. Diskontinuitas pemberian ASI
  - c. Ketidakefektifan pemberian ASI
  - d. Ketidakefektifan pola makan bayi
  - e. Kesiapan meningkatkan pemberian ASI
10. Seorang perempuan, umur 22 tahun, memiliki bayi berusia 3 bulan. Ibu membawa bayi ke Rumah Sakit untuk konsultasi laktasi. Ibu mengeluhkan 1 bulan berat badan bayi tidak mengalami peningkatan dan bayi sering terbangun ketika tidur. Berdasarkan pemeriksaan didapatkan data bahwa teknik penyusuan sudah tepat, puting susu ibu menonjol, tidak ada lecet puting susu akan tetapi bayi menyusui tidak sampai menyebabkan payudara kosong. Apa penyebab berat badan bayi tidak meningkat pada kasus diatas?
  - a. Kuantitas tidur bayi kurang
  - b. Perlekatan yang kurang benar
  - c. Kuantitas menyusui kurang lama
  - d. Bayi tidak cukup mendapatkan foremilk
  - e. Bayi tidak cukup mendapatkan hindmilk
11. Seorang perempuan, umur 30 tahun, P1A0, dirawat di Rumah Sakit. Pasien memiliki bayi yang masih berusia 3 bulan. Pasien sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki persediaan ASI. Sebelumnya pasien memberikan ASI Eksklusif, tetapi karena dirawat di Rumah Sakit bayi diberikan susu formula. Apa masalah keperawatan yang sesuai untuk kasus diatas?
  - a. Ketidakcukupan ASI
  - b. Diskontinuitas pemberian ASI
  - c. Ketidakefektifan pemberian ASI
  - d. Ketidakefektifan pola makan bayi
  - e. Kesiapan meningkatkan pemberian ASI
12. Berapa lama ASI tahan disimpan di freezer dua pintu?
  - a. 2 minggu
  - b. 3 minggu
  - c. 2 bulan
  - d. 3 bulan
  - e. 6 bulan

13. Berapa lama ASI tahan disimpan di freezer satu pintu?
  - a. 2 minggu
  - b. 3 minggu
  - c. 2 bulan
  - d. 3 bulan
  - e. 6 bulan
14. Berapa lama ASI tahan disimpan di deep freezer?
  - a. 2 minggu
  - b. 3 minggu
  - c. 2 bulan
  - d. 3 bulan
  - e. 6 bulan
15. Seorang perawat, melakukan home visit pada pasien, seorang Perempuan, umur 27 tahun, post partum hari ke 7. Hasil pengkajian menunjukkan tidak terlihat pengosongan payudara pada saat menyusui, puting susu lecet, dan hanya sebagian areola yang masuk mulut bayi. Apakah tindakan Edukasi yang paling tepat dilakukan perawat tersebut?
  - a. Anjurkan menggunakan sendok dan cangkir pada bayi yang belum bisa menyusui
  - b. Ajarkan teknik menyusui yang tepat sesuai kebutuhan ibu
  - c. Anjurkan ibu menjaga produksi ASI dengan memerah ASI
  - d. Anjurkan Ibu untuk menyusui sesering mungkin
  - e. Jelaskan Pentingnya menyusui sampai 2 tahun
16. Seorang perempuan, umur 25 tahun, P2A0, post partum spontan hari kedua, Pasien mengatakan ASI yang keluar sedikit. Hasil pemeriksaan ditemukan payudara tidak tegang, puting susu tidak lecet, ASI keluar sedikit sewaktu daerah areola dipencet. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut?
  - a. Konseling Laktasi
  - b. Promosi perlekatan
  - c. Berikan pijat laktasi
  - d. Pemeriksaan payudara
  - e. Ajarkan manajemen laktasi
17. Apa hormon yang memiliki fungsi reflex ejeksi susu?
  - a. Estrogen
  - b. Progesteron
  - c. Hormon Oksitosin
  - d. Hormon endorfin
  - e. Hormon Prolaktin
18. Seorang perempuan dengan P1A0 postpartum hari ke-3. pasien mengeluhkan ASI-nya hanya keluar sedikit. Pasien takut bayinya tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Apakah tindakan perawat yang dapat direncanakan untuk pasien tersebut?
  - a. Senam nifas
  - b. Senam kegel
  - c. Senam hamil
  - d. Perawatan payudara
  - e. Pijat oksitosin
19. Seorang perempuan G1P0A0 usia kehamilan 28 minggu, datang ke Puskesmas dengan keluhan nafsu makan semakin berkurang, disertai kenaikan berat badan dalam waktu 7 bulan hanya 2,5 kg. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh perawat, didapatkan bahwa tinggi fundus uteri ibu dengan usia kehamilan tidak sesuai. Pada usia kehamilan 28 minggu, tinggi fundus uterinya hanya 16 cm. Apa kondisi yang dialami pasien tersebut?
  - a. Intra Uterine Growth Restriction
  - b. Berat Badan Lahir Rendah
  - c. Intra Uterine Fetal Death
  - d. Premature
  - e. Abortus

20. Seorang perempuan berusia 25 tahun, post partum datang ke poli klinik kandungan RS mau melakukan konseling KB dengan tenaga kesehatan. Pada pemberian konseling keluarga berencana, Siapa yang akhirnya menentukan pilihan cara ber-KB.
  - a. Suami
  - b. Istri
  - c. Dokter
  - d. Bidan/Perawat
  - e. Ayah kandung
21. Seorang perempuan berusia 38 tahun dengan 3 anak datang ke poli klinik kandungan RS untuk konsultasi mengenai KB. Setelah di lakukan anamnese ternyata pasien menderita hipertensi dan mempunyai varises. Sebagai tenaga kesehatan KB apa yang anda anjurkan untuk dipilih oleh pasien tersebut agar tidak mengganggu kesehatannya dalam ber-KB ?
  - a. Pil
  - b. Suntik
  - c. IUD
  - d. AKBK
  - e. MOW
22. Seorang perempuan berusia 28 tahun datang untuk periksa di poliklinik kandungan RS. Pasien mengatakan habis melahirkan hari ketiga , mengeluh nyeri area payudara dengan skala nyeri 4 dari (skala 1-5), pada saat dilakukan pemeriksaan fisik payudara teraba hangat, bengkak, ASI sudah keluar dari area puting dan ibu belum menyusui dari semenjak melahirkan karena bayinya mengalami asfiksia dan harus di rawat di RS. Apakah intervensi keperawatan utama yang di lakukan perawat pada pasien tersebut?
  - a. Ajarkan latihan relaksasi nafas dalam
  - b. Ajarkan latihan massage area lumbal
  - c. Lakukan kompres area payudara
  - d. Berikan obat analgetik
  - e. Ajarkan perawatan payudara
23. Sepasang suami istri datang ke poli klinik kandungan untuk konseling KB. Suami istri itu menanyakan kelemahan dan kelebihan dari masing masing alat kontrasepsi. Perawat menjelaskan kelemahan memakai kontrasepsi kondom adalah sebagai berikut, *kecuali ...*
  - a. Tingkat kegagalannya rendah
  - b. Selalu harus memakai kondom yang baru
  - c. Selalu harus ada persediaan
  - d. Kadang-kadang ada yang tidak tahan (alergi) terhadap karetinya
  - e. Dapat sobek bila memasukkannya tergesa-gesa
24. Seorang ibu datang ke puskesmas untuk melakukan konseling tentang kontrasepsi yang harus dia pakai. Maka sebagai konselor kita harus memberikan penjelasan terkait ciri ciri kontrasepsi yang di anjurkan adalah sebagai berikut..*kecuali..*
  - a. Reversibilitas yang tinggi
  - b. Efektivitas yang tinggi
  - c. Menjarangkan kehamilan
  - d. Dapat dipakai 2 sampai 10 tahun
  - e. Tidak menghambat air susu ibu (ASI),
25. Seorang perempuan berusia 22 tahun dengan abortus imminens rawat inap di RS. Pasien mengatakan darah terus keluar dan berbentuk gumpalan disertai nyeri. Pasien merasa sedih terlihat hanya berbaring di tempat tidur, terlihat murung, dan pandangan mata kosong. Apakah pengkajian perawatan selanjutnya pada pasien?
  - a. Karakteristik perdarahan
  - b. Kebutuhan psikologis
  - c. Tingkat kecemasan
  - d. Karakteristik nyeri
  - e. Tanda-tanda vital

26. Seorang perempuan berusia 32 tahun datang ke RSIA untuk konsultasi KB. Pasien telah memiliki 3 orang anak. Sebelumnya, pasien menggunakan alat kontrasepsi pil, suntik dan kondom. Pasien mengaku takut untuk menggunakan IUD. Tapi setelah berbicara dengan tetangganya dua hari yang lalu, pasien jadi berencana untuk menggunakan kontrasepsi IUD. Apakah masalah keperawatan yang paling utama pada pasien tersebut?
  - a. Cemas
  - b. Kurang pengetahuan
  - c. Gangguan pola seksual
  - d. Gangguan Rasa nyaman
  - e. Rencana Pemasangan IUD
27. Seorang ibu post partum merasa kebingungan memilih alat kontrasepsi yang tepat, oleh perawat maternitas dijelaskan beberapa alternatif alat kontrasepsi yang dapat dipilih dengan keuntungan dan kerugiannya, serta memberikan beberapa tempat yang dapat dihubungi. Apakah peran perawat yang sesuai pada kasus diatas?
  - a. Konselor
  - b. Pendidik
  - c. Inovator
  - d. Change Agent
  - e. Advocator
28. Seorang pasien Ny.S di rawat di Ruang nifas dengan post operasi Secsio Salaria. Pasien juga mempunyai riwayat partus lama, kelainan letak janin , distensi berlebihan pada uterus dan trauma uterus. Pasien yang dalam kondisi di atas beresiko terhadap ...
  - a. Plasenta Previa
  - b. Solutio Plasentae
  - c. Ruptur uteri
  - d. KPD
  - e. Lahir premature
29. Seorang Wanita umur 27 tahun dengan Riwayat obstretic G1P0Ab0Ah0 datang ke poliklinik karena perasaan seperti Anda tidak bisa berhenti buang air kecil.keputihan atau cairan yang merembes dengan volume yang lebih dari normal,perdarahan dari vagina.mengeluh nyeri perut. Gejala di atas merupakan gejala dari :
  - a. DKP
  - b. KPD
  - c. Mioma Uteri
  - d. Solosio Placenta
  - e. Placenta Previa
30. Seorang Wanita umur 26 tahun periksa ke poliklinik kehamilan dengan keluhan perut kenceng kenceng dan sudah ada perdarahan pervaginam. Setelah di lakukan pemeriksaan di temukan letak presentasi muka. Janin yang mengalami presentasi muka di sebabkan oleh „*kecuali*..
  - a. Panggul sempit
  - b. Bayi besar
  - c. Primipara
  - d. Lilitan tali pusat di leher
  - e. Multipara
31. Seorang perempuan berusia 37 tahun, usia kehamilan 19 minggu datang ke Puskesmas dengan keluhan kram pada perut bagian bawah dan perdarahan dari kemaluannya. Hasil pemeriksaan diketahui TD 120/180 mmHg, nadi 88 kali/menit, pernafasan 24 kali/menit, suhu tubuh 37.5<sup>0</sup>C, ekspulsi sebagian hasil konsepsi, dan pemeriksaan dalam serviks terbuka. Berdasar kasus tersebut, pasien mengalami....
  - a. Abortus mola
  - b. Abortus komplit
  - c. Abortus insipiens
  - d. Abortus inkomplit
  - e. Abortus imminens

32. Seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0, usia kehamilan 24 minggu. Pasien mengatakan terpeleset di kamar mandi 3 hari yang lalu dan dirujuk ke RS karena mengalami perdarahan. Hasil pemeriksaan DJJ 150 x/menit. Saat ini pasien telah dilakukan perawatan dengan kondisi stabil. Apakah prioritas tindakan keperawatan yang dapat dilakukan pada pasien tersebut?
- Mempertahankan tirah baring
  - Pemenuhan kebutuhan nutrisi
  - Pemenuhan kebutuhan aktivitas
  - Pemenuhan kebutuhan eliminasi
  - Pemenuhan kebutuhan rasa nyaman
33. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke poliklinik kandungan RS untuk melakukan konseling KB. Pasien menanyakan kelebihan KB pil. Penjelasan terkait kelebihan KB Pil oleh perawat adalah sebagai berikut, *kecuali*.
- Kesuburan segera kembali
  - Mengurangi rasa sakit (nyeri) saat haid
  - Terlindung dari Penyakit Radang Panggul (PRP) dan Mencegah kehamilan di luar rahim
  - Mudah digunakan
  - Mencegah defisiensi Natrium dalam darah
34. Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke puskesmas untuk konsultasi KB dan ingin menggunakan kontrasepsi Pil oral dan menanyakan kemungkinan efek samping yang bisa terjadi jika menggunakan kontrasepsi Pil. Perawat menjelaskan efek samping menggunakan Pil KB sebagai berikut..
- Pusing, mual (jarang terjadi)
  - Kadang-kadang menstruasi tidak keluar selama 3 bulan pertama
  - Kadang-kadang terjadi pendarahan yang banyak pada saat menstruasi
  - Keputihan
  - Kloasma (flek)
35. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke poliklinik kebidanan RS untuk memasang alat kontrasepsi IUD. sebelum di pasang IUD pasien di lakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan USG, hal ini untuk memastikan tidak ada kontraindikasi dalam pemasangan IUD yaitu..*kecuali*...
- Kehamilan
  - Gangguan jantung
  - Peradangan alat kelamin
  - Tumor jinak rahim
  - Radang Panggul
36. Bayi baru lahir 5 menit yang lalu dan perawat sedang melakukan pengkajian awal yaitu penilaian APGAR untuk menentukan kondisi bayi. Hasil pemeriksaan nilai APGAR pada 5 menit pertama adalah 9. Apakah arti dari huruf P dalam pemeriksaan APGAR?
- Warna kulit
  - Denyut jantung
  - Pernapasan
  - Aktivitas
  - Tonus otot
37. Seorang bayi laki-laki baru saja lahir spontan aterm dengan warna kulit merah ekstremitas biru, nadi 80 x/menit, ada sedikit gerakan, tonus fleksi sedikit, dan nafas lemah. Berapa nilai APGAR bayi pada bayi tersebut?
- a. 3
  - b. 4
  - c. 5
  - d. 6
  - e. 7

38. Seorang bayi baru lahir 5 menit yang lalu dan saat pengkajian awal nilai APGAR ditemukan warna kulit tubuh yang kemerahan dengan ekstremitas biru, denyut jantung lebih dari 100, menangis spontan dengan kuat, ekstremitas sedikit fleksi. Berapakah nilai APGAR bayi tersebut?
- 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
39. Seorang bayi baru lahir 5 menit yang lalu. Bayi lahir menangis kuat, bergerak aktif, nadi 140 x/menit, bayi batuk saat distimulasi saluran napas. Berapakah nilai APGAR bayi pada kasus tersebut?
- 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
40. Seorang bayi lahir pukul 05.00 WIB di rumah sakit bersalin dengan penilaian sepintas warna kulit pucat dan tidak segera menangis, apgar skor 6. Bagaimanakah keadaan bayi tersebut?
- normal
  - sianosis
  - hipotermia
  - asfiksia ringan
  - asfiksia berat
41. Seorang bayi laki-laki baru dilahirkan 30 menit yang lalu dan segera menangis dengan spontan. Saat ini perawat akan melakukan penimbangan berat badan untuk menentukan asuhan yang akan diberikan kepada bayi tersebut. Sebelum menimbang, timbangan diberi alas kain tipis yang hangat untuk mencegah kehilangan panas. Apakah nama kehilangan panas yang mungkin terjadi bila badan bayi bersentuhan dengan benda yang dingin?
- Konduksi
  - Evaporasi
  - Konveksi
  - Koneksi
  - Radiasi
42. Bayi baru lahir 20 menit yang lalu. Perawat kemudian membantu ibu untuk segera menyusui bayinya. Saat bayi didekatkan pada payudara ibu, mulut bayi berusaha mencari-cari puting susu secara spontan. Apakah nama refleks bayi tersebut?
- Tonic neck
  - Morrow
  - Blinking
  - Rooting
  - Sucking
43. Seorang bayi laki-laki lahir 1 hari yang lalu. Bayi terlihat tidur pulas namun tiba-tiba terlihat kaget ketika mendengar suara atau gerakan yang mengejutkan. Apakah nama refleks bayi tersebut?
- Swallowing
  - Tonic neck
  - Morrow
  - Rooting
  - Sucking
44. Bayi baru lahir 20 menit yang lalu. Perawat kemudian membantu perempuan untuk segera menyusui bayinya. Saat puting susu menyentuh langit-langit mulut bayi, bayi secara spontan melakukan gerakan menghisap. Apakah nama refleks bayi tersebut?
- Tonic neck
  - Morrow
  - Blinking
  - Rooting
  - Sucking

45. Seorang bayi perempuan umur 1 hari lahir di rumah sakit. Bayi tampak gelisah. Hasil pemeriksaan fisik: TTV dalam batas normal, pada kepala terdapat benjolan terasa lembut yang melewati batas sutura. Apakah yang dialami bayi tersebut?
- ansefalus
  - hidrosefalus
  - sefalhematom
  - kaput suksadenum
  - perdarahan intrakranial
46. Seorang bayi berusia 5 hari dibawa ibunya ke puskesmas untuk control. Hasil pengkajian: bayi malas menyusu, BAB dan BAK lancer, tampak kuning pada muka, leher sampai ke pusat. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut?
- Hepatitis A
  - Hepatitis B
  - Kern icterus
  - Ikterus patologis
  - Ikterus fisiologis
47. Seorang bayi perempuan lahir spontan di rumah sakit, 2 hari yang lalu. BBL 3100 gram, BB sekarang 3000 gram. Bayi tampak kuning, menyusu kuat, tali pusat tidak ada tanda-tanda infeksi. Bayi direncanakan pulang hari ini. Apakah informasi yang dapat perawat berikan untuk ibu bayi?
- lakukan fototerapi
  - pemberian ASI setiap saat
  - pemberian makanan tambahan bayi
  - menjemur bayi setiap pagi selama 30 menit
  - pemberian antibiotik agar tidak terjadi infeksi
48. Seorang bayi perempuan baru lahir di bidan praktik mandiri. Riwayat kelahiran: anak pertama, usia gestasi 38 minggu, kala II lama. Hasil pemeriksaan: Bayi lahir tidak segera menangis, kulit jari-jari ekstremitas kebiruan, tonus otot lemas. Diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut?
- gangguan fungsi motorik
  - masalah vaskularisasi
  - kelainan jantung
  - asfiksia
  - apneu
49. Prinsip utama yang harus diperhatikan dalam merawat tali pusat bayi adalah...
- Steril
  - Bersih
  - Dibungkus rapat
  - Bersih dan kering
  - Dibungkus kassa bethadine
50. Seorang bayi perempuan baru dilahirkan 30 menit yang lalu. Bayi segera menangis dengan spontan. Setelah bayi lahir, perawat segera mengeringkan tubuh bayi dengan menggunakan kain kering yang hangat. Apakah tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh perawat tersebut?
- Menjaga nilai estetika
  - Menjaga nilai kesopanan
  - Menjaga kebersihan bayi
  - Mencegah kehilangan panas
  - Memberikan bayi kenyamanan
51. Bayi baru lahir 1 hari yang lalu dan saat ini telah dimandikan oleh perawat yang bertugas. Setelah dimandikan, pada bayi dilakukan pemeriksaan fisik dan hasilnya ditemukan rambut halus di daerah punggung, dahi, dan pipi. Disebut apakah hasil pengkajian yang ditemukan tersebut?
- verniks kaseosa
  - bercak mongol
  - seborrhea
  - lanugo
  - milia

52. Seorang perawat di ruang perinatalogi rumah sakit, melakukan pengkajian pada bayi baru lahir. Hasil pemeriksaan BB : 3000 gram, PB 49 cm, laju jantung 110x/menit, S : 36,8°C, pada kulit bayi terdapat selubung pelindung berwarna putih seperti keju. Disebut apakah hasil pengkajian yang ditemukan tersebut?
- verniks kaseosa
  - bercak mongol
  - seborhea
  - lanugo
  - milia
53. Seorang Wanita usia 27 tahun G1P0A0, usia kehamilan 38 minggu datang ke klinik bersalin. Pasien mengatakan perutnya terasa kelancang-kencang dan selalu ingin mengejan. Perawat Fulana memeriksa HIS pasien, didapatkan hasil frekuensi His yang muncul semakin sering dan durasi semakin lama. Hasil pemeriksaan tersebut merupakan faktor ...
- Power
  - Passage
  - Passager
  - Position
  - Psychological
54. Seorang Wanita usia 22 tahun G1P0A0 dengan usia kehamilan 38 minggu datang ke rumah sakit rujukan dari Faskes I dengan indikasi PAP sempit. Bentuk panggul pada Wanita dapat mempengaruhi proses persalinan. Alasan utama pasien tersebut dirujuk adalah...
- Power
  - Passage
  - Passager
  - Position
  - Psychological
55. Panggul paling baik untuk Wanita, bentuk PAP hamper bulat, diameter antero – posterior kira-kira sama dengan diameter transversa, bentuk anatomi panggul ini sangat proposional untuk persalinan normal adalah...
- Gynecoid
  - Anthropoid
  - Android
  - Platypelloid
  - Transverse lie
56. Seorang Wanita usia 32 tahun G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu, ibu mengatakan perut terasa kencang-kencang, saat dilakukan pemeriksaan *Vagina Toucher* (VT), didapatkan hasil pembukaan 3 cm. Wanita tersebut pada fase persalinan...
- Kala I fase laten
  - Kala I fase aktif
  - Kala II
  - Kala III
  - Kala IV
57. Seorang Wanita usia 30 tahun G3P2A0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke rumah sakit karena pasien merasa kontraksi yang semakin sering dan teratur, Perawat Nabila melakukan pemeriksaan, didapatkan hasil TD: 120/80 mmHg, DJJ 140 X/menit, terdapat tekanan anus, perinium menonjol, vulva membuka, hasil pemeriksaan *Vagina Toucher* (VT) pembukaan sudah lengkap dan terdapat lendir darah. Wanita tersebut pada fase persalinan...
- Kala I fase laten
  - Kala I fase aktif
  - Kala II
  - Kala III
  - Kala IV

58. Perawat Fulana melakukan pemantauan DJJ pada pasien yang melakukan persalinan di Kala I fase aktif, pemantauan DJJ pada fase aktif dilakukan setiap...
- 4 jam sekali
  - 1 jam sekali
  - 30 menit sekali
  - 15 menit sekali
  - 10 menit sekali
59. Perawat Fulana melakukan pemantauan DJJ pada pasien yang melakukan persalinan di Kala I fase laten, pemantauan DJJ pada fase laten dilakukan setiap...
- 4 jam sekali
  - 1 jam sekali
  - 30 menit sekali
  - 15 menit sekali
  - 10 menit sekali
60. Perawat Fulana melakukan pemeriksaan HIS pada ibu bersalin setiap 30 menit sekali, menghitung frekuensi dan durasi HIS, perawat Fulana sedang melakukan pemantauan...
- Kesejahteraan janin
  - Kemajuan persalinan
  - Kesejahteraan ibu
  - Kegawatan janin
  - Kesiaagaan persalinan
61. Perawat Fulana melakukan pemeriksaan penurunan kepala janin, didapatkan hasil kepala janin Sebagian sudah masuk PAP, pada saat dilakukan palpasi bagian kepala janin teraba 2 jari di bagian simfisis. Dokumentasikan hasil pemeriksaan tersebut di dalam partograph...
- 1/5
  - 2/5
  - 3/5
  - 4/5
  - 5/5
62. Perawat Anita melakukan pemeriksaan DJJ pada ibu yang melakukan proses persalinan. Perawat Wulan sedang melakukan pemantauan...
- Kesejahteraan janin
  - Kemajuan persalinan
  - Kesejahteraan ibu
  - Kegawatan janin
  - Kesiaagaan persalinan
63. Seorang Wanita usia 21 tahun G2P1A0 usia kehamilan 40 minggu, datang ke rumah sakit karena sudah merasakan kontraksi. Hasil palpasi : kepala teraba pada satu sisi kanan perut ibu dan bokong pada sisi lainnya, bagian bawah perut kosong. His 5X/10 menit/40 detik. Pemeriksaan VT didapatkan hasil pembukaan 5 cm. Data folus untuk mendukung diagnose dari kasus tersebut adalah...
- Hamil 40 minggu
  - Hasil VT pembukaan 5
  - Bagian bawah perut kosong
  - His 5 X dalam 10 menit dan durasinya 40 detik
  - Palpasi kepala pada satu sisi
64. Seorang Wanita usia 30 tahun G2P1A0 datang ke Rumah Sakit Bersalin, pasien mengatakan perut terasa kenceng-kenceng ingin bersalin. Hasil palpasi abdomen pada bagian atas perut teraba bagian bulat, keras dan melenting, bagian perut kiri pasien teraba tahanan memanjang, bagian bawah perut pasien teraba bagian bulat lunak. Kontraksi uterus 3x dalam 10 menit durasi 40 detik. Hasil pemeriksaan VT: pembukaan lengkap, ketuban utuh, teraba os sacrum, penurunan kepala Hodge III+. Presentasi janin pada kasus tersebut adalah...
- Face
  - Brow
  - Breech
  - Shoulder
  - Transverse lie

65. Seorang Wanita usia 30 tahun G2P1A0 datang ke Rumah Sakit Bersalin, pasien mengatakan perut terasa kenceng-kenceng ingin bersalin. Hasil palpasi abdomen pada bagian atas perut teraba bagian bulat, keras dan melenting, bagian perut kiri pasien teraba tahanan memanjang, bagian bawah perut pasien teraba bagian bulat lunak. Kontraksi uterus 3x dalam 10 menit durasi 40 detik. Hasil pemeriksaan VT: pembukaan lengkap, ketuban utuh, teraba os sacrum, penurunan kepala Hodge III+. Pada pemeriksaan DJJ pada kasus tersebut punctum maksimum berada pada sebelah...
- Kanan setinggi pusat ibu
  - Kiri setinggi pusat ibu
  - Kanan atas pusat ibu
  - Kiri atas pusat ibu
  - Bagian simfisis ibu
66. Seorang Wanita usia 20 tahun G1P0A0, Usia kehamilan 39 minggu datang ke Rumah Sakit karena sudah merasakan kontraksi yang sering. Tinggi Badan Ibu 140 cm, BB 45 Kg. TFU 30 cm, saat dilakukan USG berat janin hanya 1800 gram. Faktor – faktor passage yang harus dikaji yang dapat mempengaruhi persalinan klien adalah...
- Psikologis ibu
  - Ukuran plasenta
  - Bentuk panggul ibu
  - Kekuatan kontraksi ibu
  - Letak janin
67. Seorang Wanita usia 25 tahun. G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu. In partu kala I persalinan. Klien tampak gelisah, sering berteriak kesakitan. Saat dikaji, klien mengatakan takut dilakukan operasi karena mulesnya sering tetapi pembukaan tidak bertambah. Posisi klien yang paling mudah untuk bersalin adalah...
- Squatting
  - Standing
  - Siting
  - Knelling
  - Walking
68. Seorang wanita berusia 29 tahun, G1P0A0 hamil 40 minggu, datang ke Rumah sakit bersalin. Hasil pemeriksaan TFU 36 cm, klien mengatakan sudah merasakan kencang-kencang sejak 12 jam yang lalu dan sekarang selalu merakan ingin mendedan. Hasil pemeriksaan HIS terasa 5x setiap 10 menit durasi 50 detik. Hasil pemeriksaan VT pembukaan 10 cm, keluar lendir darah dari kemaluannya, serviks teraba tipis dan mendatar. Berdasarkan informasi tersebut, kondisi pasien tersebut berada pada fase...
- Kala I fase aktif
  - Kala I fase laten
  - Kala II
  - Kala III
  - Kala IV
69. Seorang Wanita berusia 29 tahun, 5 menit yang lalu telah melahirkan bayinya. Terdapat semburan darah, tali pusat memanjang. Manajemen aktif kala III yang dapat dilakukan pada klien adalah...
- Lakukan inisiasi menyusui dini
  - Anjurkan ibu untuk nafas dalam
  - Ajarkan klien untuk mengejan
  - Memberikan oksitosin
  - Melakukan suction pada bayi
70. Pemantauan TD, Nadi, TFU dan perdarahan pada ibu pasca persalinan di 1 jam pertama setelah in partu adalah...
- Setiap 15 menit
  - Setiap 30 menit
  - Setiap 60 menit
  - Setiap 5 menit
  - Setiap 10 menit