

PAP SMEAR

WIWI KUSTIO PRILIANA

Pengertian

Pap smear disebut juga tes, cara atau tindakan yang biasa dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk memastikan apakah ibu menderita penyakit pada daerah kelamin yang lebih tepatnya pada kandungan (yang biasa disebut dengan kanker serviks)

Lanjutan

Pap smear tidak hanya efektif untuk mendeteksi kanker serviks tapi juga perubahan sel serviks yang dicurigai dapat menimbulkan kanker. Deteksi dini sel ini merupakan langkah awal untuk menghindari timbulnya kanker serviks

Etiologi

- ▶ Penyebab : virus (human papiloma virus) ,

Penyebaran virus :

- ▶ Virus ini sangat mudah berpindah dan menyebar tidak hanya melalui cairan tapi juga bisa berpindah melalui sentuhan kulit.

Tanda dan gejala

- ▶ Mengalami sakit saat buang air kecil
- ▶ Pada saat menstruasi darah yang keluar dalam jumlah banyak dan berlebih
- ▶ Pada saat menopause akan mengalami rasa sakit pada bagian paha atau salah satu paha menjadi bengkak, nafsu makan menjadi sangat berkurang, BB tidak stabil, dan susah buang air kecil.

Lanjutan

- ▶ Saat berhubungan intim selalu merasakan sakit disertai pendarahan
- ▶ Mengalami keputihan yang tidak normal disertai perdarahan dan jumlahnya berlebih
- ▶ Sering merasakan sakit pada daerah pinggul

Syarat PEMERIKSAAN PAP SMEAR

- ❖ Usia di atas 18-70 tahun
- ❖ Menikah pada usia muda (dibawah 20 tahun)
- ❖ Pernah melakukan senggama sebelum usia 20 tahun
- ❖ Pernah melahirkan lebih dari 3 kali

PERSIAPAN SEBELUM PAP SMEAR

- Pada saat pengambilan lendir, usahakan otot-otot vagina rileks
- Tidak melakukan hubungan suami istri 48 jam sebelum pengambilan lendir mulut rahim
- Waktu yang paling baik untuk pengambilan lendir adalah 2 minggu setelah haid
- Jangan menggunakan pembasuh antiseptik atau sabun antiseptik di sekitar vagina selama 72 jam sebelum pengambilan lendir

TERIMA KASIH

